
NOTE

SUR LE MALE DU *VESPERUS XATARTI*, Mulsant.

PAR M. JACQUELIN-DUVAL.

(Séance du 8 Mai 1850.)

M. Mulsant, dans son Histoire naturelle des Coléoptères de France (*Longicornes*), a décrit sans l'avoir connu, sous le nom de *Xatarti*, Dej. inédit, un *Vesperus* que M. Léon Dufour avait découvert dans le royaume de Valence (Espagne), et que depuis M. Xatart avait retrouvé à Prats de Mollo (Pyrénées-Orientales), mais la femelle seule en était connue. J'ai retrouvé à Prades, au pied du Canigou, sur le côté opposé à Prats de Mollo, un individu mâle appartenant évidemment à l'espèce décrite par M. Mulsant; car tous les caractères assignés par lui au *V. Xatarti* ♀ sont parfaitement applicables au ♂ que je possède, en tant bien entendu que caractères communs aux deux sexes. Je l'ai pris le mois de mars dernier, desséché et pendu à une toile d'araignée (probablement depuis l'an passé), dans l'intérieur d'un chêne yeuse creux; il était à peu près intact, malgré son mauvais état apparent.

Je crois donc que c'est là un fait intéressant et qu'il est utile d'en donner la description et la figure (Pl. 11, figure 6.)

VESPERUS XATARTI, Muls. Hist. nat. des Coléoptères
Longicornes, pag. 219. 3 (♀).

♂ *Capite post oculos subparallelo thoraceque brunneo-ferrugineis, densè punctatis, isto conico, disco spatio lævi, lateribus foveola leviter impressa; antennis dentatis, corpore paululum longioribus, articulis compressis, elongatis; elytris pallidis, fortiter punctatis, abdomen obtegentibus.*

Long. 22 mill.

♂ Tête ovale, subhorizontale, à peu près parallèlement prolongée derrière les yeux, arrondie en arrière et portée sur un cou, d'un ferrugineux brunâtre, densément et ruguleusement ponctuée, garnie de poils jaunâtres, courts, peu denses et couchés, creusée d'une fossette profonde au devant des antennes, tuberculeusement élevée à leur base, offrant un petit sillon qui part de la fossette et se prolonge un peu en arrière. Yeux d'un brun noirâtre, faiblement échancrés, assez saillants. Mandibules ferrugineuses, leur extrémité noire. Antennes très peu plus longues que le corps, ferrugineuses, très finement pubescentes, un peu dentées en scie, à articles comprimés, assez allongés, le premier ponctué, les autres très finement pointillés. Prothorax à peu près aussi long que la tête depuis la base des antennes jusqu'au cou, rétréci en avant, conique, tronqué à la base où il est rebordé, relevé et rebordé en devant où il est un peu échancré; densément ponctué, offrant sur le milieu du disque un espace entièrement lisse et une petite fossette de chaque côté; de la même

couleur que la tête et garni de petits poils semblables. Ecusson noirâtre, très obtusément arrondi au sommet. Elytres d'un pâle livide, deux fois aussi larges que le prothorax à sa base, trois fois aussi longues que larges, un peu rétrécies dans leur partie moyenne, arrondies chacune séparément à l'extrémité; flexibles, rebordées, assez fortement ponctuées, présentant quelques traces vagues de lignes longitudinales élevées; offrant une pubescence concolore très peu dense; un peu ciliées dans leur pourtour. Dessous du corps d'un livide brunâtre ou un peu ferrugineux, peu densément pubescent. Pieds allongés, de même couleur que le dessous du corps, couverts d'une pubescence jaunâtre.

